

Betegtájékoztató

Hörgőgyulladás (Obstuctiv bronchitis)

Tisztelt szülő, gondviselő!

A gyermeke kórházi ellátásához az ön beleegyezése szükséges. Pár mondatban tájékoztatni szeretnénk a gyermeke betegségének lényegéről, tüneteiről, a terápia módjáról, és a szóba jövő szövődményeiről.

A hörghurut a csecsemő és gyermekkorban a leggyakoribb betegségek közé tartozik. Vírusok okozzák.

Tünetei: A felső légúti hurut jelein kívül, hörghurut sajátos tünetei jelentkeznek izgatott, szaggatott köhögés, neheztett kilégzés, orrszányi légzés, a légzési segédizmok használata, sípolás, zöreje hallható. A kórházi bentlét alatt fizikális vizsgálaton túl, vér, vizelet, (pulzoximetria), orvosi megítélés szerint mellkas Rtg vizsgálat történik. A tervezett terápia, hörgőtágítók aerosol formában történő beadásából áll, melyet kortól függően babyhaler és volumatic segítségével történik. Ezenkívül orrszívás és orrcsepp adása is javasolt. Láz esetén fájdalomcsillapítást alkalmazunk szirup, tableta, kúp formájában. Kifejezett nehézlégzés és romló vérgáz értékek esetében orrszondán vagy maszkon keresztül O₂ terápiát alkalmazunk és gyakran steroid adása is szükséges lehet. A kiszáradás megelőzésére a gyakori elaprózott itatás mellett infusios terápiát adunk. A gyermek megnyugtató érdekében egy hozzá közel álló személy bent tartózkodhat, de ha a beavatkozásokat nehezen tűri a gyermek enyhe nyugtatása is szükségessé válhat valamint a végtagok rögzítésre kerülhetnek.

A megfelelő kezelés elmaradása esetén a hörgőgörcs légzési elégtelenséghez, fulladáshoz, ill. a szövődmények gyakoribbá válásához vezethet. A szükséges terápia alkalmazása mellett is kialakulhat azonban szövődményként középfülgyulladás, tüdőgyulladás ilyenkor antibiotikum adására kerülhet sor.