

BETEGTÁJÉKOZTATÓ **A VISSZÉRBETEGSÉGRŐL**

Tisztel Hölgyem/ Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozás melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon az alábbi ismertetéssel, szeretnénk segítségéra lenni a betegségérők, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

Visszérbetegségről beszélünk, ha a vénák kanyargós lefutásúvá válnak és kitágulnak. Faluk megvastagodhat, bennük gyakoribbá válik a vérrögképződés, a vénafal gyulladása.

A betegség kialakulását elősegítő tényezők: örökletes hajlam (a családban volt már vénás betegség), terhesség, fogamzásgátló tabletták szedése, álló-ülőfoglalkozás, elhízás, székrekedés, 60 év feletti életkor, változás kora nőknél, magas sarkú cipő viselése, nagy erőfeszítést igénylő munka vagy sport.

A vénás betegség tünetei, jelei:

"nehézláb" érzés, feszülés érzés, melegségérzés, bokaduzzanat, fáradékonyság, zsibbadás, éjszakai lábszárgörcs, állandó tompa fájdalom, pókszerű vénatágulatok a lábon, látható visszér a lábon, bokavizenyő, festékfoltok, ekcéma, bőrsorvadás, fekélyes seb a lábszáron

A betegség megállapításához szükséges vizsgálati módszerek:

a panaszos láb megtekintése, megtapintása, járáspróba rugalmas pólyával alsóvégtagi UH vizsgálat sz.e. bőrgyógyászati, érsebészeti vizsgálat is

Gyógykezelés:

Rugalmas pólya illetve harisnya használata, vénás torna, vénás nyomást, lábszár vizenyőt csökkentő gyógyszerek, sebészeti kezelés, műtét, vénás injectio adása a kitágult érbe

A gyógykezelés esetleges mellékhatásai, szövődményei:

Gyógyszeres kezelés esetén: gyomortáji fájdalom, hányinger, lazább széklet, bőrkivetés, bőr kivörösödés, fejfájás.

Fenti panaszok a gyógyszerek étkezés közbeni bevitelével csökkenthetők illetve megelőzhetők.

Műtét esetén: a visszéresség kiújulása

Injectios kezelés esetén: vénafal gyulladása, vérrögösödés

A visszér betegség kialakulását megelőzhetjük a tartós állás illetve ülés kerülésével testsúlycsökkentéssel, rendszeres mozgással, székletrendezéssel, valamint a fenti tünetek észlelése esetén kezelőorvosánál való időbeni jelentkezéssel.