

Tudnivalók és utasítások ambuláns/egynapos műtétek/beavatkozások esetén

Kedves Betegünk!

A fájdalmas vizsgálatokat, kezeléseket és műtéti beavatkozásokat rendszerint érzéstelenítéssel végezzük. A beavatkozást megelőzően, amennyiben az altatóorvos gyógyszert rendel, a kórteremben azt megkapja előkészítésként. A beavatkozás előtt a kéz- vagy az alkar vénájába egy műanyag csövet vezetünk be, amelyen keresztül infúziót adunk, majd az érzéstelenítést általában az azon át adott injekcióval kezdjük el. Hosszabb beavatkozás esetén ezt az injekciót megismételjük, vagy az altatógázokat adunk arcmaszok, gégemaszok, illetve a légcsőbe vezetett műanyag cső (tubus) segítségével, amikor Ön már alszik. Az altatás során biztonsági riasztókkal felszerelt műszerek segítenek az Ön alapvető élettani működésének fenntartásában.

A beavatkozást megelőzően a következőket kérjük:

- Rendszeresen szedett gyógyszereit a beavatkozás napján is vegye be, amennyiben szemcseppet használ azt cseppentse be, a kontaktlencséjét vegye ki.
- A beavatkozást megelőzően 6 órán belül szilárd ételt, kávé ne vegyen magához.
- Folyadékot (víz, tea) formájában a beavatkozás előtt 2 óráig szükséglete szerint fogyaszthat. Azt követően kerülje a folyadékfogyasztást.
- Amennyiben dohányzik, azt a beavatkozás napján minimálisra csökkenti szíveskedjék.
- Ékszereit távolítsa el.
- Ha a körmeit lakkozta, azt eltávolítani szíveskedjék
- Amennyiben hallókészüléke van, azt hozza magával.
- Kivehető műfogsorát altatás előtt ki kell vennie.

Mint minden orvosi beavatkozásnak, az altatásnak is lehetnek mellékhatásai, szövődményei:

Nagyon gyakori: torokfájás, hányinger, fejfájás.

Gyakori: átmeneti tájékozatlanság, látászavar, vénagyulladás, szájsérülés, remegés,

Ritka: fogsérülés, gégegörcs, véletlen ébrenlét, a gyomortartalom belehelése, légútbiztosítás kivitelezhetetlensége.

Nagyon ritka: súlyos gyógyszerallergia, keringésmegállás.

Ön ezen ismertetőt elolvasva látja, hogy a szövődmenylehetőségeket nem titkoljuk, ugyanakkor igyekszünk megnyugtatni, hogy ezen veszélyeket ismerjük, képesek vagyunk azokat felismerni és elhárítani, ezzel a kockázatot minimumra csökkenteni. Rossz általános állapot, súlyos kísérőbetegségek és/vagy hosszú, nagy műtéti utáni beavatkozás növelik a szövődmények lehetőségét és súlyosságát, sőt nagyon ritkán halálos szövődmény is előfordulhat. Ennek valószínűsége azonban kicsi és mi mindent elkövetünk, hogy ezt megelőzzük.

A műtétet/beavatkozást követően Ön csak akkor bocsátható el, ha:

- Nem áll fenn sebészeti probléma, az Ön tudata és ítélőképessége tiszta, önállóan képes járni, tud önállóan inni és vizeletet üríteni, nincs hányingere, fájdalma egyszerű fájdalomcsillapítókkal jól enyhíthető.

A beavatkozás után 2 órán keresztül Önt megfigyelése alatt tartjuk.

Az érzéstelenítést követően otthonába kísérővel, gépkocsival távozhat. Szükség esetén gondoskodni kell az Ön otthoni ellátásáról, felügyelettel. A beavatkozást követően ételt, italt mértéktartóan fogyasszon. Az altatás utóhatása miatt leghamarabb 24 óra elteltével vehet részt aktívan az utcai forgalomban, vezethet autót, dolgozhat gépen, fogyaszthat alkoholt. Csak ezen idő elteltével tanácsos szerződést, megállapodást kötnie.

Ha bármit részletesebben szeretne tudni, bátran kérdezze meg altatóorvosától (aneszteziológus), azt követően szíveskedjék aláírni a beleegyező nyilatkozatot.

Igazolom, hogy a fenti tudnivalókat megértettem, tudomásul vettem és elfogadom.

Ózd,év.....hó.....nap

felvilágosítás végző orvos
aláírása