

## Enteritis( bélhurut)

Tisztelt szülő, gondviselő!

A gyermeke kórházi ellátásához az ön beleegyezése szükséges. Pár mondatban tájékoztatni szeretnénk a gyermeke betegségének lényegéről, tüneteiről, a terápia módjáról, és a szóba jövő szövődményeiről

Enteritis lényege: Az enterális fertőzéseken olyan megbetegedéseket értünk, amelyeknek közös vezető tünete a hasmenés. A kórokozók általában a székletben tartózkodnak és a széklettel jutnak a külvilágba. Többségük vírus, ritkábban baktérium esetleg protozoon.

Kivizsgáláshoz megfigyeljük a székletürítés gyakoriságát , színét, szagát. A betegnél vér, vizelet ált+üledék ill. széklet tenyésztés vizsgálata történik. Orvosi megítélés alapján Hasi UH.

Terápia: Elsősorban tüneti terápiát alkalmazunk. A folyadék háztartás rendezésére mindenképpen előnybe részesítjük a szájon át történő folyadék bevitelt. Elaprózva itatás történik illetve ORS adása ( rehydráló folyadék) egyszerre kis mennyiségben. Folyadék bevitel visszautasítása esetén gyomorszondát vezetünk le. Étrendi megszorítás a közhiedelemmel ellentétben nem indokolt.4 óra itatás után meg kell kezdeni a kornak megfelelő táplálást. Súlyos kiszáradás esetén szükségessé válhat infusios terápia. Bakteriális ok esetén antibiotikum adása indokolt lehet, de nem feltétlenül. Láz esetén fájdalomcsillapítást alkalmazunk, szirup, tableta formájában. A gyermek megnyugtató érdekében egy hozzá közel álló személy bent tartózkodhat, de ha a beavatkozásokat nehezen tűri a gyermek enyhe nyugtatása is szükségessé válhat valamint a végtagok rögzítésre kerülhetnek. A bőr védelmére a gluteális tájékat gyakran lemossuk,szárítjuk kenőccsel védjük. A fertőzés továbbvitelének megakadályozása érdekében a beteget elkülönítjük.

A megfelelő kezelés elmaradása esetén a beteg kiszáradhat és súlyos toxicus shock állapotába kerülhet.