



Almási Balogh Pál Kórház Anaesthesiologia

Melléklet 6

3600 Ózd Béke u. 1-3. Tel: +36 48 574-450

Anaesthesiológiai perioperatív therápiás átadó lap

BETEG NEVE: _____ ÉLETKORA: _____
TAJ-száma: _____ ALLERGIA: _____
Műtéti diagnózis: _____ VÉRCSOPORT: _____

Preoperative PREMEDICATIO:

Premedicalo orvos:	Premedicatio műtét előtt este:
Anesztézia módja:	Premedicatio műtét előtt 1 órával:
Antibiotikum profilaxis:	Infúziók:
Thrombózis profilaxis:	Vérkészítmény:
Megjegyzés:	

A beteget előkészítő nővér tölti ki:

Műtét előtti RR: _____ Hgmm	Műtét előtti Pulzus: _____ /m	Temperatúra: _____ °C
Premedicatio(adag, beadás módja, ideje):	Infúziók:	Nővér aláírása:
Megjegyzés:		

Postoperative: BETEGÁTADÁS

HELYE: _____ Időpontja: _____
Alkalmazott anesztézia módja: _____ Időtartama: _____

Műtőben alkalmazott:

Anesztetikumok(mennyiségük):	Folyadékbevitel:
Egyéb gyógyszerek:	Transfusio:
Vizsgálatok:	Diuresis: _____ ml

Beteg állapota osztályra szállítás alkalmával (légzés, keringés, kooperativitás, tudat állapot):

RR: _____ Hgmm P: _____ /m Resp: _____ /min Spo2: _____ %

Tudatállapot:

Postoperatív therápiás javaslat:

Megjegyzés (speciális viszonyok):

Dátum: _____ Átadta: _____ Átvette: _____



BETEG NEVE: _____ SZÜLETÉSI IDEJE: _____

TAJ-száma: _____ LAKCÍME: _____

MŰTÉTI DIAGNÓZIS: _____

Beleegyző nyilatkozat Anaesthesiológia elvégzéséhez

A tervezett műtéthez szükséges érzéstelenítésbe, altatásba, valamint az ahhoz szükség esetén kapcsolódó intenzív kezelésbe beleegyzem.

Az érzéstelenítéssel kapcsolatos felvilágosító tájékoztatót írásban megkaptam. Lehetőségem volt arra, hogy azt elolvassam, és az érzéstelenítést végző orvossal megbeszéljem. Kérdéseimre kielégítő választ kaptam. Hozzájárulok, hogy a rajtam tervezett műtétet/vizsgálatot az altatóorvos szerint megfelelő érzéstelenítési eljárás segítségével végezzék el, az eljárás közben szükségessé váló eszközös vizsgálatokat, beavatkozásokat elvégezzék, az érzéstelenítést a beavatkozás közben esetlegesen felmerülő új szakmai igényeknek, vagy problémáknak megfelelően módosítsák.

Tudomásul veszem, hogy a műtétet követő 24 óraban önállóan nem közlekedhetek, ez idő alatt folyadékot csak orvosi engedéllyel fogyaszthatok, altató, nyugtató fájdalomcsillapító szert csak orvosi utasításra kaphatok.

Javasolt anaesthesia:

Az ajánlott anaesthesiát nem fogadom elragaszkodom.

Az esetleges károkról, melyek ennek folytán egészségemet érhetik felvilágosítást, kaptam, tudomásul veszem és vállalom az esetlegesen előforduló lehetséges szövődményeket.

Dátum: _____

.....

Beteg aláírása

Utasítások az altatott járó betegek kórházból való távozása utáni időszakra:

Kérjük, hogy amennyiben műtéti érzéstelenítésre járó betegként kerül sor, saját és mások biztonsága érdekében, kórházból való távozását követő első 24 óraban tartsa be az alábbi utasításokat!

Altatás után csak felelős felnőtt kísérelvel menjen haza!

Géppel, balesetveszélyes háztartási készülékkel ne dolgozzon!

Kerüljön minden, egyensúly érzéket, kívánó helyet, helyzetet, eszközt. Hivatalos iratot ne írjon alá, szerződést ne kössön! Gépjárművet ne vezessen! Szeszitalt ne fogyasszon, ne dohányozzék!

Kérdezzen!

Ha bármit részletesebben szeretne tudni, bátran kérdezze meg altatóorvosától a műtét előtti találkozásakor!

A tájékoztatást követően felmerült kérdéseim és az arra kapott válaszok:

.....
.....
.....

Kelt:.....

.....
tájékoztatást adó orvos aláírása

Az ajánlott anaesthesiát elfogadom:

beteg aláírása

vagy a törvényes képviselő aláírása (1)

Neve:

Születési helye, ideje:

Lakcíme:

(1)cselekvőképtelenség, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett **CSAK** a törvényes képviselő írhat alá!

Nagyon súlyos, zavart, eszméletlen, nagyon előrehaladott korú beteg esetén:

A beteg állapotát illetően, a beavatkozások (műtéti és anaesthesiológiai) elvárható eredményeit, elvárható általános állapotából adódható szövődményekről felvilágosítottak az előzőekben leírtaknak megfelelően.

A beavatkozásokba beleegyzem a hozzátartozóm érdekében, melyet aláírásommal tanúsítok.

a hozzátartozó aláírása



Betegtájékoztató!

Kedves Betegünk!

A fájdalmas vizsgálatokat, műtéteket érzéstelenítés alatt végzik. Az altatóorvos feladata, hogy a műtét során Ön ne érezzen fájdalmat, és fenntartsa szervezete normális működését. Együtműködése az Ön biztonságát szolgálja. A következőkben röviden ismertetjük az érzéstelenítés különböző módjait és veszélyeit.

Az érzéstelenítés módjának kiválasztása:

Mindegyik érzéstelenítési módszernek vannak előnyei és hátrányai is. Mi mindig azt javasoljuk önnek, ami a legjobban megfelel a tervezett műtét, és az ön általános állapota szempontjából.

Altatás (általános érzéstelenítés):

A fájdalommentesség az egész testre kiterjed és öntudatvesztéssel társul. Az altatás kezdetén fokozatosan alváshoz hasonló állapotba kerül, amit a műtét végéig fenntartunk.

A műtétet megelőzően tableta vagy injekció formájában megkapja az előkészítést. Ezt követően a kéz vénájába kanült vezetünk be, az altatást azon átadott injekcióval kezdjük el. Hosszabb műtétek esetén ezt az injekciót megismételjük és/vagy altató gázokat adunk arcmaszk, gégemaszok illetve a légcsőbe vezetett cső (tubus) segítségével, amikor Ön már alszik. Ezekkel a módszerekkel közvetlenül a tüdőbe juttatjuk az oxigént és az altatógázok keverékét.

A módszer rendkívül biztonságos, mert így tökéletesen tudjuk biztosítani a lélegeztetését, hányás esetén tüdeje védve van a félrenyeléstől. Ezt a módszert alkalmazva izomlazítókat is adunk, ami a sebész számára biztosít jobb feltételeket.

Veszélyei:

Sajnos minden beavatkozás veszélyekkel, nem várt következményekkel járhat. Az érzéstelenítéssel kapcsolatos súlyos szövődmények még rossz általános állapotú betegnél is rendkívül ritkák. A modern altatás (általános érzéstelenítés), mely korszerű gyógyszerekkel, lélegeztető- gépel is felszerelt altatógépekkel történik, lehetővé teszi, hogy a légzést, keringést és a többi szerv működését is biztonságosan fenntartsuk, és a szervezet működését különféle készülékek segítségével (EKG, stb.) folyamatosan ellenőrizzük.

Az altatás általános mellékhatásai, szövődményei:

Nagyon gyakori: száraz torok, átmeneti zavartság, tájékozatlanság, hányinger, hányás, fejfájás, hátfájás

Gyakori: vénagyulladás, erős fájdalom műtétet követően, átmeneti látászavar, szájsérülés, nehéz légút biztosítás, remegés, hidegrázás.

Kevésbé gyakori: fogsérülés, gégegörcs, verőér szúrása központi véna biztosításakor, gépek meghibásodása, véletlen ébrenlét, légút biztosítás kivitelezhetetlensége,

Ritka: gyógyszerallergia, szívmegeállás, halálozás.

Regionális, helyi érzéstelenítés:

A fájdalommentesség a test bizonyos, körülírt területeire, vagy csak az operáció helyére korlátozódik, öntudatvesztéssel nem párosul.

A kar fő idegtörzsének érzéstelenítése a felső végtag teljes érzéstelenségét okozza.

Gerinc közeli (spinális vagy epidurális) érzéstelenítésnél az alsó végtag, csípő és alhas fájdalommentessége érhető el. Ennél a módszernél a gerincoszlop egy megadott pontján érzéstelenítőt fecskendezünk az érző idegek közé, vagy köré.

Az injekció előtt a bőrt érzéstelenítjük, így a beavatkozás gyakorlatilag fájdalommentes.

A kielégítő érzéstelenítés velejárója, hogy az érintett végtagot átmenetileg, a műtét alatt nem érzi és nem képes mozgatni a beteg.

A regionális, helyi érzéstelenítés mellékhatásai:

A helyi érzéstelenítés e típusai kisebb megterhelést jelentenek a szervezetnek, az idegsérülések igen ritkák.

Gyakori: fejfájás, átmeneti vizeelési zavar.

Kevésbé gyakori: derékfájás, tályog epidurális kanülálást követően, központi idegrendszer görcsei, szívmegeállás.

Nagyon ritka: alsó testfél bénulás, gennyes agyhártyagyulladás, gerinchártya bevérzés, halálozás.

Kérjük, műtét előtt saját érdekében ügyeljen a következőkre!

- Hat órával a műtét kezdete előtt ne egyen ne igyon, ne dohányozzon!
- Kivehető fogprotézisét, kontaktlencsáját távolítsa el! Ha van, vegye le ékszereit, testékszereit (piercing), mossa le a körömlakkot, szemfestéket!
- Rendszeresen szedett gyógyszereit mutassa meg altatóorvosának is, aki el fogja mondani, hogy mely gyógyszereket hagyja ki és melyeket szedje még a műtét napjának reggelén is.
- A műtőbe szállítás előtt rendszeresen használt szemcseppjét cseppentse be, asztma spray-jét hozza magával.

